

Formulaire de trigonométrie (à connaître !)

Les courbes représentatives des fonctions sinus, cosinus et tangente sont à connaître.

Ensembles de définition et dérivées

1. $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$
2. \cos et \sin sont de classe \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R} avec, pour tout entier naturel n et tout réel t :

$$\cos^{(n)}(t) = \cos\left(t + n\frac{\pi}{2}\right) \quad \sin^{(n)}(t) = \sin\left(t + n\frac{\pi}{2}\right).$$

3. \tan est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} I_k$ où $I_k = \left] \frac{-\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$.

~~\tan est définie sur $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\} = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} I_k$ où $I_k = \left] \frac{-\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$ **Hors-programme.**~~

\tan est de classe \mathcal{C}^∞ sur D et $\forall t \in D, \quad \tan'(t) = 1 + \tan^2(t) = \frac{1}{\cos^2(t)}$.

~~\tan est de classe \mathcal{C}^∞ sur D et $\forall t \in D, \quad \tan'(t) = 1 + \tan^2(t) = \frac{1}{\cos^2(t)}$ **Hors-programme.**~~

Valeurs remarquables

t	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin(t)$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(t)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan(t)$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	

Formules d'addition

$$\begin{aligned} \sin(a+b) &= \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a) & \sin(a-b) &= \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a) \\ \cos(a+b) &= \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b) & \cos(a-b) &= \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b) \end{aligned}$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan(a)+\tan(b)}{1-\tan(a)\tan(b)} \quad (\text{sous réserve que chaque terme existe}).$$

Pour tout réel t et tout entier naturel n :

$$\cos(nt) = \operatorname{Re} \left[(\cos(t) + i \sin(t))^n \right] \quad \sin(nt) = \operatorname{Im} \left[(\cos(t) + i \sin(t))^n \right]$$

Formules de duplication

$$\begin{aligned} \cos(2t) &= \cos^2(t) - \sin^2(t) = 1 - 2\sin^2(t) = 2\cos^2(t) - 1 \\ \sin(2t) &= 2\sin(t)\cos(t) \end{aligned}$$

Angle moitié

$$\cos(t) = \frac{1 - \tan^2\left(\frac{t}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{t}{2}\right)} \quad \sin(t) = \frac{2 \tan\left(\frac{t}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{t}{2}\right)} \quad \tan(t) = \frac{2 \tan\left(\frac{t}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{t}{2}\right)}$$

(sous réserve que chaque terme existe)

Période, antipériode

\cos et \sin sont 2π -périodiques, \tan est π -périodique.

$$\sin(t + \pi) = -\sin(t) \quad \cos(t + \pi) = -\cos(t) \quad \tan(t + \pi) = \tan(t)$$

Pour tout réel t et tout entier relatif p :

$$\sin(t + p\pi) = (-1)^p \sin(t) \quad \cos(t + p\pi) = (-1)^p \cos(t)$$

Arcs associés

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \cos(t) \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \sin(t) \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \frac{1}{\tan(t)} \quad (t \in \mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{2}\mathbb{Z})$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = \cos(t) \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = -\sin(t) \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + t\right) = \frac{-1}{\tan(t)} \quad (t \in \mathbb{R} \setminus \frac{\pi}{2}\mathbb{Z})$$

$$\sin(\pi - t) = \sin(t) \quad \cos(\pi - t) = -\cos(t) \quad \tan(\pi - t) = -\tan(t) \quad (t \in D)$$

Formules de linéarisation (transformation de produits en sommes)

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b))$$

$$\sin(a)\sin(b) = \frac{1}{2}(\cos(a-b) - \cos(a+b))$$

$$\sin(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\sin(a+b) + \sin(a-b))$$

$$\sin^2(t) = \frac{1 - \cos(2t)}{2} \quad \cos^2(t) = \frac{1 + \cos(2t)}{2}$$

Transformations de sommes en produits

$$\begin{aligned} \sin(p) + \sin(q) &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \sin(p) - \sin(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \cos(p) + \cos(q) &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) & \cos(p) - \cos(q) &= -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \end{aligned}$$

Équations trigonométriques

- étant donné un réel α , l'ensemble des solutions de l'équation $\sin(x) = \sin(\alpha)$ (d'inconnue x) est $S = \{\alpha + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{\pi - \alpha + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- étant donné un réel α , l'ensemble des solutions de l'équation $\cos(x) = \cos(\alpha)$ (d'inconnue x) est $S = \{\alpha + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-\alpha + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- étant donné un réel $\alpha \in D$, l'ensemble des solutions de l'équation $\tan(x) = \tan(\alpha)$ (d'inconnue x) est $S = \{\alpha + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$
- étant donné un réel $\alpha \in D'$, l'ensemble des solutions de l'équation $\cotan(x) = \cotan(\alpha)$ (d'inconnue x) est $S = \{\alpha + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$